

7

**Berberides marinae**, seu **Concha Matres Unionum** dicitur. **Rond.** 23. **Parlein.** **Mteer.** **Stätschen.** **Gesh.** 124  
 Sunt Conchæ marinae squirales, et inaequaliter manifeste crasse, et è pluribus laminis testaceo sibi invicem imposi-  
 tivo efformatae, à quarum unumquodque extremis superficibus Conchæ squamulosissimae redduntur. Sunt in super- mediocriter umbe-  
 nate rostro umbonis recta incurvato, à quo ex uno latere in obliquâ lineâ, quasi ala expanditur, quæ in extima superficie  
 Conchæ angulam obtusam constituit, à qua Conchæ subrotundatur ad oppositum umbonis latus usque, ubi sulcus semicircularis  
 mediantè appensione auriculari rostro accretâ efficitur. à rostro et umbone extima conchæ superficies squamulosissimum apparet,  
 colore luride viridescente, omnium tamen ad obliquum flavescens vergens, supra quam striæ maiores et latiores sulcæ ex-  
 currunt, quarum dux semper sibi proximiores existunt, et maiori intervallo à reliquis duabus paribus, sibi quæ magis vicinis  
 distant. internæ cardo cum suis crassissimis, et è pluribus lamellis efformatis apophysis latissimam maiorem literam M. sed obli-  
 quâ sita, et quasi incertè constituit, inter quarum sinus plura foraminula lubricanda observantur, sed tantum exca, et minime Con-  
 chas penetrantia; latera apophysium extimam Conchæ superficiem respiciens, sunt quasi oblique præcisâ cum manifesta la-  
 mellarum apparitione, è quibus constituntur. De reliquo Conchæ superficies interna convexissima, argentea splendens cum con-  
 nullo rubore, et viriditate hinc inde à reflexione radiorum, lucis perelegantibus, et nonnullis vestigiis adhxite-  
 nis animalis inaequalibus litris suis tenuissimis inquinatis.

**Berberis marina**, seu **Concha Mater Unionum** dicitur, vulgaris, maior, ex obscuro flavescens luride viridescens stri-  
 ata litris suis, è parte umbonis topho imbutâ, representata.

