


*Concha marina aquivalves inaequilatera.* Gleichschälige, und ungleichseitige.

*Müller-Muscheln*.  
*Concha marina Rhomboides naviformis.* *Oss ablonge*, unum vier edere *Müller Schriftlein* do.  
Est Concha marina equivalvis, in aqua latera, medioris magnitudinis, oblonga, et quasi quadrata  
a cardine ad oram vero magis contracta: ex una latera extremitate ad aliam longe magis elongata,  
la-  
tes, versus quod cervix seu rostrum umbras, tantum incurvatur, festinans brevius recta quali linea  
et duabus angulis uno sunt, et altero oblongo terminatur; alterum vero longius dubius angulus quoque  
circumscriptum in medio profundatule luctans, qui inclusus ad interna extremitate concavitate  
quidam non emuntur vestri usque propagatur: est insuper Concha haec rotabilis umbonata, et rotatio  
tricella cervicibus seu rostris umbrorum utrilibet valva in signiter eminentibus, et tantum ad latum  
brevius incurvata: ac in levius sensibili separatis ita ut latitudinem quoddam spatium ex planum inter  
relinquit, per medium hucus plani secundum longitudinem recta linea excutit, in qua proprie Concha  
cardo confluit; nam mediante illa mego tendens minimis in lobo infrastructa valva per glyptum inter  
et articulationem: E summittate umbonis seu rostris incipiunt striae runc magis runc minus eminentes rugos  
ac horizontata, que oblique descendentes ad extremitatem organum utique producuntur. Plasmam autem inter duo  
extremas planis lineis rectis et obliquis intinguntur, que hinc inde sine ordine excurrentes lese se  
perforant in alijs locis, et in angulis neutros efformentur. Causa autem extinxit valvulum ora hinc inde labores  
et iniquitates sunt ut concha excastra laudare nequant. Natura in hunc flexum extremitate valvulum iniquus  
quidam Alga, seu multo algeiformis brevissimum, ac latissimum prospectus quo duplicata vel triplicata eiusdem  
excretionis velicit una post alteram ex interstitiis talitudinari, in superficie valvulum situm additum ad  
internam condit, et praeditum, ut ad illum prates aquam si penetrante queat. De reliqua quemadmodum Concha  
nigritatem sua superfcie propter rugas striatas et fuligine iniquipennis, et labris ex parte, et varia coloribus  
migrantes cintur, alio, et leviter sed tenuiter tamens turrida pingitur: ita interna nigritate iste politatissima  
seri quidam etiam color, et externa superfcies, tamens tenuiter limbo quidam obscuriora circa est, et  
tam profundi excavata obliteratur, ut navi ad amandum quidam afflare praeterit, extrema interna ora  
prutes pectinatum lineam rectam crevis instructam, et cardinam Concha constituentem leviter re  
manente.

Concha marina Rhomboidica naviformis  
medioeris, terrestris coloris, è latere car-  
dinalis representata.

Eadem tunica sua muscosa adhuc vestita, & latere opposto representata, ut alio, seu nudus alpinus interstitiis testularum, erasens apparent.



Eadem minores, et minime tunica suā muscosā omnimode adhuc operta.

