


Concha marina ^{Lamelliformis.} Per ab lange pind allent fugerundate ^{et} *Heller* - *Rhomboidea*.
Est Concha marina à precedente rhomboidata naviforme distincta: I. quid in extremitatibus suis nullo modo sit angulosa sed subrotundata. II. quid non sit fucata. III. quid non sit tam insigne rumbona-
ta ac ventricosa. IV. quid planum inter duo rectra litura sit longe angustius. V. quid non sit linearium
sed quadratum. VI. quid cardo non consistat in profilio rectâ linea. VII. sed in extremitatibus tan-
tillum incurvata. VIII. quid crenula non sit euclidae magnitudinis, sed in extremitatibus longiori-
es et magis oblique, in medio vero minores. IX. quid umbilicis sit levior, et non ita eminens, et X. perio-
dus, et primus incipiant. XI. quid trix longe sit tenuiores, et XII. Valva sonita in aqua. XIII.
in medio ore extremitate tantillum compressus. XIV. plerumque tristriatus coloris. XV. interea autem non
sit tam profunde excavata, et demum XVI. tenuioris testa, ac XVII. nulla alga, seu multo algae
formi excedente, ex extrema superfcie testularum circa oram litarum exornata.

Concha marina ^{Lamelliformis.} Unde lati et verius
extremam oram, sunt biliar rugos, ac striata, ordi-
nariae, et in medio notabiliter compressa.
terrestris coloris.
+ Rhomboidata.



Concha mari - na ^{+ Rhomboidata} *Pelviformis*. *Das Meer* *Hand* *Becles*.
Est Concha marina ad duas precedentibus Conchulis oblongis distincta: I. quid non sit oblonga, sed
quasi rotunda, et atere opposito cardinis, qui per lineam rectam finitur unumq[ue] crenula intitulat-
a, quae in utraque extremitate longiores sunt, in medio vero minores. II. quid sit insigne ven-
tricosa, ita ut progra conda non aliud quamcumque restrictius videntur. III. cervix leuirostris crassior, et
ad latas notabiliter incurvata, instructa. IV. spatium inter due rectra latitudine et quadratum, et
ad extremitatem quadratum plus minus crenulato exornatum. V. Conda externe omnime strigata,
et trix latissimis rugulis rugo praeferita ad extima oram perceptibili bus. VI. pars in-
terea quoque leviter striata est, extima autem interna euclida, ora profilio crenulo instru-
ta, ex utroque latero ad rectam lineam aliquę lese prospicantibus, quae crenula appendice gau-
dam aliquae testa saudit, videntur, separata à proprii testa conchis, cui ha externe non latius-
cula, sed subrotundus appearant.

Concha marina ^{Pelviformis} è parte undens re-
presentata. Striatu. Trix latissimis, ad oram
rugosis. Extra quam trix subrotundata testa
lubidinosa apparent, dilute cinerei coloris.
+ Rhomboidata.



Eadem minor aburnea, ex utraque facie
representata.



Eiudem interna facies tantillum striata,
cum piano squamo, extremis crenulis longiori-
bus, et extima interna ora fucata, ad cre-
nulas aliquę longiores.