


Pholades marini, cardine seu pileolo cellulato. Meer-Syris. Will. Schell. mit ge-  
löcherter Hoche, oder Hütlein.

Sunt Conchæ marinæ æquivalentes inæquilatere leviter ambonata structure, et striis per-  
cussatis ex uno cardinis latere admodum elongatæ, et per harmoniam unitæ, ac paulatim  
angustatæ, et demum in extremitate subrotundatæ, ex altero vero cardinis latere brevissime  
æquistant, et in æumen tantillum obtundunt, ac quasi ad plausum apertæ sunt: testâ cardis  
dinis externâ extorsum replicatâ, et induas quasi laminas oblongas incurvatæ, unam scilicet  
superiorem, et alteram inferiorem, et quasi pileolum efformantes, inter quas medianibus septu-  
agulis cellularum quadratæ seu camerationes efficiuntur, quarum supremæ tres, quatuor, aut quinque tes-  
tam omnimodè perforant, ac interne penetrant, parvulam cavitatem oblongam incurvatam, et striatam  
striis à septuagulis constitutibus, atque apparentibus efformatis, ibi versus inferiorem par-  
tem relinquentes. lamina inferior tantillum ultra cellulas supra concham porrigitur, et ad æu-  
men extremitatis usque producitur; superior vero lamina paululum longius ab æmine unam in tes-  
tam infernam conchæ assumitur, cardo in super statim sui cellulis quadratis, et testam replicatam  
interiore forantibus, internâ instructus est apophylli oblongâ rotundâ, et extorsum incurvatâ in  
interiore concha crassiore, in minori tenuiore, integrâ concha externè striata est striis ab æmine  
cardinis incipientibus, et statim sub testulâ replicatâ emergentibus, è qua per totam concham  
distribuantur, tali tamen discrimine, ut quæ à cardine ad oram præparantur, et lateri breviori  
aperte, et acuminato proximiores sunt, densiores papillose, et quasi unitæ existant, quo ma-  
gis autem versus lætus longius et subrotundatum producantur; è magis etiam attenuen-  
tur, donec tandem quasi omni modè obliterentur, circulares à contra seu fissiatis striæ, qui-  
bus nullimodè conchæ denatæ sunt, quo magis extremitati longiori læte approximant, è crassi-  
ores sunt, proximiores autem lateri breviori fragiliores evadunt, et hæc interfectione  
acum striis longitudinalibus prædictas papillulas constituunt, interna conchæ facies alia-  
rum concharum more lævis est, nisi quod quandoque hinc inde striæ longitudinales et nu-  
gule striarum circularium observentur.

Pholas marinus maior Anconitanus cardine, seu pileolo cellulato albicans, seu offi, coloris  
circa extremitatem subrotundati lateris pluribus. Balanus. Bon. 23. et 24.  
Concha altera longa. Rend. 23. Que andare lanæ Meer-Syris. Schell. Geln. 332.

È parte cardinis cum suo pileolo rappresentatus.



È parte oræ re-  
sentatus, ut apertura cum acumi-  
nerio brevi-

onio appare-

præ-  
ne la-  
ant.