

Solen marinus tenuioris testæ seu max. minus valvis inæqualiter longis. L. 1. 3. de Coch. mar. Angl. tit. 37.

Solenes marini. Meer-Flagel-Muscheln.

Sunt Conchæ marinx plerumque æqualiter inæquilateræ, non umbonate à cardine tantillum profundiore et ligamento nigro oblongo externe nonnihil eminente instructæ ad oram utique angustissime et vix digitum transversum latæ, neque uno latere in lineâ rectâ, quam maxime elongatè, altero però brevissimo existente, utroque autem in sua extremitate inclusi sili, seu apertè, et hiante; extremitas lateris longioris tantillum subrotundatè est brevioris contra obtusè præciâ, scilicet versus ligamentum valvas colligens, in qua insuper si simbria angustissima observatur, externe tantillum profundiuscula, in interna autem cœcæ parte paululum eminens scabrosâ, ac inæquali, quasi calu super addita, et ætæta esset, ac hæc simbria externe emergunt quam plurimâ fibre testaceæ testam ipsam huiusmodi cœnarum constituentes, quæ quò proximiores sunt ligamento, eò citius transversim reflectuntur, et incurvantur versus latus cardinis seu ligamento instructum, donec tandem in extremitate lateris longioris totam valvam occupent, et illam frequenter siliâ incurvatâ aut reflexionè longiorem reddant, ac simul nonnihil rugosissimam, alterâ però mediâ valvæ pars versus latus scilicet ligamento oppositam sibi simpliciter rectè instruitur, ac perficitur; interna Conchæ facies præter prædictam sèbriem simbriæ in extremitate lateris brevioris siliâ omnimodè absâ levè et splendens existit, exceptâ parvâ apophylli oblongâ similiter absâ, ac in utraque extremitate dentatâ, quæ statim à ligamento in limbo oræ incipit, et usque ad extremitatem propagatur, cuius denticulâ à tetraminiis oppositè apophylæo alterius valvæ recipiuntur, et sic valvæ sibi, per siliam, et harmoniam aduandantur, externa conchularum superficies, ut iam dictum est, rugosula apparet, præsertim circa reflexionem, et incurvaturam transversam prædictarum siliarum testacearum, quæ etiam ad quondam oblongam si lævissimam vergunt. Solenes marini tenuioris testæ. seu Mares dicti. Meer-Flagel-Muscheln. Sie Mänlein.

A Pæminis differunt I. quòd sint tenuioris testæ, itâ, ut quasi transparentes sint, et ideo etiam longè fragiliores Pæminis. II. quòd habeant colores longè vividiores tam quæd albedinem, quam quæd sâlcum castaneum, quibus elegantè variegantur. III. quòd simbria in extremitate siliâ sit tenuissima, et quasi imperceptibilis, neque interne ita scabrosâ observetur.

Solen marinus tenuioris testæ, seu max. longior, et maior valvis quasi æqualibus, convexis representatus è parte ligamenti, ut illâ externe apparet.



Idem concavè representatus, ut ligamentum internè appareat, cum siliâ adiacentibus apophyllis denticulatè.



Idem minor externe representatus è parte aperturæ, sed valvis inæqualibus.



Idem minor externe representatus è parte ligamenti.

