

Concha marina notabiliter umbonata, et recta incurvata aequalves, aequaliter
 vel inaequaliter cervice, vel rostro latiore, vel tenuiore subrotunda, circinata, die
 tx, laeves, vel potius fasciata, vulgares. Gleichschlange, gleich oder ungleichseit
 ige glatte ründerste gemeinere Meer-Muscheln mit breiterem oder engerem
 mercklich erhöhten, und grad gekrümmten Hals, oder Schnabel.


Lufter-Hist. Conch. lib. 3. sect. 3. cap. j.
 icone 3. ser. 2. A.

loc. citato sect. 4. c. 2. ic. 2.
 ser. 3. Insula Garnsey.



loc. citato c. 3. ic. 2. ser. 3. A.
 Insula Garnsey.

loc. citato ic. 4. ser. j.



Concha mari-
 mediana, sive gestreiffte Meer-Muscheln
 Conchula marina striata subrotunda, vel circi-
 nata notabiliter umbonata, et recta incurvata,
 cervice, vel rostro tenuiore. loc. cit. sect. 3. cap. j.
 icone 2.

riae vulgaris. res. Se-
 Eadem, sed aliquanto maius or cervi-
 ce, seu rostro latiore, fasciata plu-
 rimis falcis transversis donata,
 sive striata striis multum distanti-
 bus. loc. cit. cap. 2. ic. 3. la-



maica. Tellina
 Brasilienfis.
 Bon. 304.