


Pectinoidea marina. *P. Heger*. *Sorinæ*. *Alfred*, *idem*. *Gonnen*. *Beit*.
 Sunt Concha marinae præcedentibus Pectinibus quasi similes, exceptis potissimum Strus, quæ
 in his l' sunt tenuiores, et copiosiores, ac omnes sibi invicem æquales. *H.* quod à cardine ad
 eram in æquali à se distantia directæ sunt, ac si per amussium quoddam studio impressæ es-
 sent. et *III.* quod in interna palvarum superficie eminentes existant, externe verò cancellata,
 seu tantillium concave sint, quod valde raro observatur in testaceis, et ego quidem in unica Coch-
 leæ castali formi marina albæ vidi.

Pectinoidea marinum striatum tenue, æquiaritum, auribus triquetris, et ex uno latere vulvo-
 riorum externe candida, superiore
 conchæ aurum omnimodè æretis, maximum, valvâ inte-
 vere è *Egiphtio* rufescente: utraque
 ve, ac externe quinque
 quali: parallelis trans-
 nunquam ulâ. Bon-08



Idem sed tantillium minus, et sine falcibus transversis. Amussium. Rumph. t. 45. l. A. et
 B. quælibet valvæ ex utraque facie representata est.

