to, supra verò leviter eminens, ac quasi planus, striatus striis à centro umbilico donato ad peripheriam usque porrectis exornato. Fungites marinus corallinus striatus, et crispatus, seu Astroites undulatus albescens politus undulis subfuscis. Vid. Hist. Lap. fig. p. 52. t. 12.

79. Funguli marini suo pediculo et pileolo donati: Acetabulum marinum procerius. Tourn. 569. ein kleiner steinerner Meer-Schwämlein. — Acetabulum Tourn.

80. Funguli marini corallini caliciformes rotundi externè leviter striati, et excrescentiis corallinis rubris et albis exornati. intus verò lamellis à centro cavitatis ad peripheriam usque extensis donati, cum et sine pediculo. kleine rundt kelch-förmige Meer-Schwämlein, oder Nägelein. Fidem calice uno alteri innato. — Funguli marini caliciformes.

81. Fungitae marini corallini caliciformes mediocres et minores subrotundi vel compressi triangulares externè punctati, vel leviter striati; internè verò in cavitate subrotundâ, vel ovali lamellis è puncto centrali ad peripheriam extensis, ac in basi vestigiis pediculi donati. alius maior cinereus è Gottlandia calice uno alteri innato sine vestigiis pediculi. — Fungitae marini caliciformes.

82. Fungitae marini corallini maximi cyathiformes nonnihil compressi, et incurvati, externè striati striis à basi vestigio pediculi donatâ, et acuminatâ, vel magis latiusculâ ad summitatem usque extensis, suturisque circularibus firmatis, internè verò lamellis tenuissimis à rimâ oblongâ concavitatis ovalis ad summitatem porrectis exornati è Montibus Cataloniae. grosse Versteinerte dreÿeckete becherförmige Meer-Schwämlein, oder Nägelein. — Cyathiformes.

83. Fungus