Cordioidæitæ umbone latiore, ventricoſiſſimi ſtriati cardinibus unitis, vel quaſi unitis, ex uno latere umbone tantillum eminente, et ſtriato ſtriis, tenuioribus, ſtrias craſſiores à cardinibus emergentes, et ad oram acuminatam uſque productas, tranſverſim interſecantibus, et ſic opus reticulare conſtituentibus, ex altero verò latere ſtatim infra unionem cardinum cavitatem anguſtam oblongam efformante, quæ cavitas oblonga demum in ſpinam eminentem cumilla alterius lateris in imo Conchitis conjunctam deſinit: flaveſcentis coloris, colliguntur in eodem loco cum præcedentibus.

Maior



Idem minimus, ſed ob iniuriam temporum undique exeſus, ita ut ſtriæ nullo modo appareant: ex eodem loco.

Cordioidæitæ minores oblongi cardinibus unitis, vel quaſi unitis, ſed admodum anguſtatis, et tenuibus, ac quaſi acuminatis, ſtriati ſtriis tenuioribus à cardinibus excurrentibus, et ad oram valvarum uſque propagatis ex uno latere in ſpinam levem deſinentem, ex altero verò in foſſulam oblongam totum latus quaſi occupantem terminatam ſubflaveſcentis coloris ex eodem loco.

Idem ſed valvis ſeparatis, et ruptis.

Valva ſeparata eiuſdem Cordioidæitæ cinerei S. Gallenſis ex utroque latere repræſentata.