Testacea marina, vel eadem lapidea tubulum coniformem alicuius Cornu instar rectum, vel in se convolutum efformantia concamerata concamerationibus septis scutellæ-formibus plerumque externè apparentibus inter se distinctis siphunculoq; à basi latiore incipiente, usq; ad coni extremitatem per latera interni parietis pervadente donata Ammoniæ dicta. Meer-Horner.

Ammonia testacea Cornuum Ammonis instar in se in plano horizontali convoluta spiris à se invicem integrè divisis proportionata, vestigiis septorum scutellæformium externè apparentibus, et siphunculo propè latera interni parietis ad extremitatem coni papillulâ donati usq; transeunte: Meer-Ring Horner. Breyn. p. 22.

Ammonia lapidea Lituiformis Cornuum Ammonis instar in se in plano horizontali in extremitate convoluta anomala, id est principio recto longo ante eius convolutionem usq; donata, spiris à se invicem integrè divisis, vestigiisq; septorum scuformium externè ap- tibus, et siphunculo tera interni pari- tremitatem coni seunte. Lituites pag. 28. Fin Meer-Ris-

tellæ parenpropela- etis ad exusque tran- dicta Breyn versteinerter- chloss-Stab.

Ut Septula scutellæ-formia appareant, aperta.

Rupta: ex Insulis Moluccensibus, Jamaica, &c.

Microscopio aucta.

Septuli pars convexa cum adhærente adhuc siphunculo.

Pars concava.

Ammonia marina integrè divisa, nodosa, et concamera-

ta, cellulis scutelbus inter se lis septlæformidivisis.

Ostreum parvum Cornu Arietini simile. Bonann. p. 438. No 9.