



Echinus marinus Ovarius rotundus nudus maior papillis mammillaribus scitularis <sup>foliis</sup> minoribus, et hinc pluribus in una serie ordinis contentis aculeis longissimis e mari rubro Aldrov. cum omnibus suis partibus internis.

Corticis eius crustacei exterior facies rufescens e pulvere obscure rubro, et splendente, quo integra eius superficies inspersa existit cum duplici ordine papillarum mammillarum scutularum suisq; septis e suturis linearibus transversis formatis, quosq; distinguuntibus papillulis simplicibus interstium occupantibus.

Eiusdem corticis interna facies, ut supradixte articulationes tessellarum angulosarum, et figura apophysium cordiformium, circa foramen oris sitarum, eo clarius apparent.



Decem ossicula vomeri-formia: An Echinodi maiores vulgares, seu dentes Echinite maximi laticlavii? Luid. N. 3078. t. 9.

Partes internae Echini cortice ablato conspicuae secundum Ramphium tab. 35. fig. A.



Quorum bases quoque decem ossicula phlebotomi-formia dicta.

Quae simul unita et articulata unam e partibus internis Echini exhibitis a Ramphio et hic quoque representatis non inepte praeferre videntur.



Quatuor ossicula columnettae-formia: An pillularia Luid. dicta? N. 3195. t. 5.

Quingue ossicula imbrici-formia, seu lintri-formia.

