

ORDO SECUNDUS.

Cochlex marina longæ ore, et mucrone simul.

SERIES PRIMA.

Cochlex marina minores longæ ore, et mucrone simul, canaliculata et ventricosæ.

CLASSIS PRIMA.

Cochlex marina minores longæ ore, et mucrone simul mediocriter elongatis, canaliculata, et ventricosæ: Buccinula dicte.

Die kleinere Meer-Kinck-Hörner.

- GENUS I. Buccinula marina canaliculata, canaliculo recto.
- GENUS II. Buccinula marina canaliculata canaliculo introrsum incurvato.
- GENUS III. Buccinula marina canaliculata canaliculo extorsum incurvato umbilicata.
- GENUS IV. Buccinula marina canaliculata rostrata canaliculo extorsum incurvato umbilicata.
- GENUS V. Buccinula marina canaliculata canaliculo extorsum incurvato umbilicata et sulcata.

SERIES SECUNDA.

Cochlex marina maiores longæ ore, et mucrone simul.

CLASSIS PRIMA.

Cochlex marina maiores longæ ore, et mucrone simul, æquali longitudine notabiliter elongatis, canaliculata, et insigniter ventricosæ:

Buccina maiora dicte.

Die größere Meer-Kinck-Hörner.

- GENUS I. Buccina marina maiora rostrata labio oris dextro papillalis aculis similibus exornata.
- GENUS II. Buccina marina maiora rostrata labio oris dextro anguloso.
- GENUS III. Buccina marina maiora rostrata labio oris dextro quasi fimbriato, et dentato.
- GENUS IV. Buccina marina maiora rostrata rugosa.
- GENUS V. Buccina marina maiora rostrata labio oris dextro insigniter fimbriato.
- GENUS VI. Buccina marina maiora canaliculata, et sulcata.

CLASSIS SECUNDA.

Cochlex marina maiores longæ ore, et mucrone simul, sed ore notabiliter longiore, ipso mucrone: Buccinoidea dicte.

Die größere Meer-Kinck-Hörner mit längerem Gehör, als gewöhnlich.

- GENUS I. Buccinoidea marina maiora labio oris dextro simplici, sinistro vero labiato.
- GENUS II. Buccinoidea marina maiora utroque oris labio insigniter fimbriato, ac in superio- fimbriis transverse sulcato.
- GENUS III. Buccinoidea marina maiora labio oris dextro insigniter fimbriato, et in superio- tuberculis transverse sulcato.
- GENUS IV. Buccinoidea marina maiora labio oris dextro simplici, sed superius sulcato.
- GENUS V. Trocha-Buccinoidea natica maiora.
- GENUS VI. Buccina, vel Buccinoidea marina maiora Anomala.

CLASSIS TERTIA.

Cochlex marina maiores longæ ore, et mucrone simul, sed mucrone notabiliter longiore ipso ore: Buccinastra dicte.

Die größere Meer-Kinck-Hörner mit längerem Gehör, als gewöhnlich.

- GENUS I. Buccinastra marina maiora longissima, labio oris dextro undatum fimbriato.
- GENUS II. Buccinastra marina maiora utroque labio oris insigniter fimbriato.
- GENUS III. Buccinastra marina maiora labio oris dextro simplici, sed superius sulcato.
- GENUS IV. Buccinastra marina maiora labio oris dextro fimbriato, sinistro vero cristato.

*Buccinula.
Kleine Kinck-
Hörner:*

*Buccina maiora
größere Kinck-
Hörner.*

*Buccinoidea.
Mit längerem
Gehör, als
gewöhnlich.*

*Buccinastra.
Mit längerem
Gehör, als
gewöhnlich.*