



Foto 1: Abbildung der 12 am häufigsten gefangenen Wanzenarten des Rüss-Spitz. **1a** *Leptopterna dolabrata*, **1b** *Coreus marginatus*, **1c** *Eysarcoris aeneus*, **1d** *Spilostethus saxatilis*, **2a** *Lygocoris pabulinus*, **2b** *Anthocoris nemorum*, **2c** *Stenodema calcaratum*, **2d** *Stenotus binotatus*, **3a** *Sigara striata*, **3b** *Sigara lateralis*, **3c** *Sigara falleni*, **3d** *Adelphocoris seticornis*.

3. DANK

Herr L. RESER stellte mir die gesammelten Wanzen zur Verfügung und gab mir wertvolle Hinweise beim Erstellen des Manuskriptes, wofür ich ihm herzlich danke. Folgende Spezialisten/innen waren mir bei der Bestimmung kritischer Arten behilflich: J. PERICART (F-Montereau), U. GÖLLNER-SCHEIDING (D-Berlin) und A. ROTZER (CH-Gampel, Corixidae). Herr B. MERZ erlaubte mir freudlicherweise, die Entomologische Sammlung der ETH Zürich zu benützen. Schliesslich möchte ich mich bei meiner Frau Maja für mancherlei Unterstützung bedanken.