

Inhalt

Fauna centrohelvetica

- HERGER, P.: Zur Insektenfauna des Flachmoores Wauwilermoos, 498 m, Kanton Luzern.
 III. Coleoptera 1 (Käfer). 1 - 20

Fauna centro- et meridiohelvetica

- TÓTH, S. & REZBANYAI-RESER, L.: Weitere Angaben zur Bremsen- und Wollschweber-
 fauna der Zentral- und Südschweiz (Diptera: Tabanidae, Bombyliidae). 21 - 36

Fauna meridiohelvetica

- REZBANYAI-RESER, L.: Die Nachtgrossfalterfauna des Berghanges Sasso Corbaro,
 oberhalb Bellinzona (Tessin), des angeblich einzigen schweizerischen Fundgebietes
 der xerothermophilen Spannerart *Paraboarmia viertlii* (BOHATSCH, 1883) (Lepido-
 ptera: Macroheterocera). 37 - 122

Fauna helvetica

- VIDLIČKA, L. & REZBANYAI-RESER, L.: Neuere Angaben zur Schabenfauna der Schweiz
 (Blattaria, Blattellidae: Ectobius). 123 - 134
 KOČÁREK, P. & REZBANYAI-RESER, L.: Neuere Angaben zur Ohrwurmfauuna der Schweiz
 (Dermaptera). 135 - 148

Fauna europaea

- REZBANYAI-RESER, L.: Mesapamea-Studien XII. - Weitere Fundangaben von Mesapa-
 mea remmi REZBANYAI-RESER, 1985, aus Europa (Lepidoptera: Noctuidae). 149 - 152

Buchbesprechungen

- REZBANYAI-RESER, L.: Buchbesprechung. - NOWINSZKY, L. (edit.): The handbook of light
 trapping. - Savaria Press (Hungary). 153
 REZBANYAI-RESER, L.: Buchbesprechung. - WIROOKS, L.: Die ökologische Aussagekraft
 des Lichtfanges. - Verl. Wolf & Kreuels (Deutschland). 154

Neu für die Fauna der Schweiz:

Haematopota subcylindrica PANDELLÉ, 1883 (Diptera: Tabanidae) und

Lomatia sabaea (FABRICIUS, 1781) (Diptera: Bombyliidae), S. 21-36

sowie

Chelidurella guentheri GALVAGNI, 1994 (Dermaptera), S. 135-148